



事務連絡
令和3年6月16日

各

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」の
一部訂正について

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」（平成28年3月28日付け薬生審査発0328第15号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知）の別添「薬局製剤指針」において、一部誤りがあり別紙のとおり訂正しますので、貴管下関係業者に対し周知方お願いします。



第257号

薬局製剤指針 正誤表

(下線部分が訂正箇所)

訂正箇所		正	誤
一連番号	処方番号	該当箇所	
24	抗ヒスタミン薬3-②	用法及び用量 1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人 (15才以上) 1包 <u>1.4g</u> , 11才以上 15才未満 大人の $\frac{2}{3}$, 7才以上 11才未満 大人の $\frac{1}{2}$, 3才以上 7才未満 大人の $\frac{1}{3}$ 本品は定量するとき、塩酸ブソイドエフエドリン ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl : 201.69$) <u>3.9</u> ~ <u>4.7%</u> , アリメマジン酒石酸塩 [($C_{18}H_{22}N_2S$) ₂ · $C_4H_6O_6 : 746.99$] <u>0.11</u> ~ <u>0.13%</u> 及びカフエイン水和物 ($C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O : 212.21$) <u>3.2</u> ~ <u>3.9%</u> を含む。	用法及び用量 1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人 (15才以上) 1包 <u>1.0g</u> , 11才以上 15才未満 大人の $\frac{2}{3}$, 7才以上 11才未満 大人の $\frac{1}{2}$, 3才以上 7才未満 大人の $\frac{1}{3}$ 本品は定量するとき、塩酸ブソイドエフエドリン ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl : 201.69$) <u>5.4</u> ~ <u>6.6%</u> , アリメマジン酒石酸塩 [($C_{18}H_{22}N_2S$) ₂ · $C_4H_6O_6 : 746.99$] <u>0.15</u> ~ <u>0.18%</u> 及びカフエイン水和物 ($C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O : 212.21$) <u>4.5</u> ~ <u>5.5%</u> を含む。
26	抗ヒスタミン薬5-②	用法及び用量 1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人 (15才以上) 1包 <u>1.2g</u> , 11才以上 15才未満 大人の $\frac{2}{3}$, 7才以上 11才未満 大人の $\frac{1}{2}$, 3才以上 7才未満 大人の $\frac{1}{3}$ 本品は定量するとき、 <i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4 : 390.87$) <u>0.15</u> ~ <u>0.18%</u> , 塩酸ブソイドエフエドリン ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl : 201.69$) <u>4.5</u> ~ <u>5.5%</u> , グリチルリチン酸 ($C_{42}H_{62}O_{16} : 822.94$) <u>5.0</u> ~ <u>6.1%</u> 及びカフエイン水和物 ($C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O : 212.21$) <u>3.8</u> ~ <u>4.6%</u> を含む。	用法及び用量 1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人 (15才以上) 1包 <u>1.0g</u> , 11才以上 15才未満 大人の $\frac{2}{3}$, 7才以上 11才未満 大人の $\frac{1}{2}$, 3才以上 7才未満 大人の $\frac{1}{3}$ 本品は定量するとき、 <i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩 ($C_{16}H_{19}ClN_2 \cdot C_4H_4O_4 : 390.87$) <u>0.18</u> ~ <u>0.22%</u> , 塩酸ブソイドエフエドリン ($C_{10}H_{15}NO \cdot HCl : 201.69$) <u>5.4</u> ~ <u>6.6%</u> , グリチルリチン酸 ($C_{42}H_{62}O_{16} : 822.94$) <u>6.0</u> ~ <u>7.3%</u> 及びカフエイン水和物 ($C_8H_{10}N_4O_2 \cdot H_2O : 212.21$) <u>4.5</u> ~ <u>5.5%</u> を含む。

訂正箇所		正	誤
一連番号	処方番号	該当箇所	
39	鎮咳去痰薬 12-③	用法及び 用量	
		1 回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔を置いて適宜服用する。 大人 (15才以上) 1包 1.6g, 11才以上 15才未満 大人の 2/3, 8才以上 11才未満 大人の 1/2, 5才以上 8才未満 大人の 1/3, 3才以上 5才未満 大人の 1/4	1 回量を次のとおりとし、1日3回、4時間以上の間隔を置いて適宜服用する。 大人 (15才以上) 1包 1.5g, 11才以上 15才未満 大人の 2/3, 8才以上 11才未満 大人の 1/2, 5才以上 8才未満 大人の 1/3, 3才以上 5才未満 大人の 1/4

