

## (2) 死亡

### ア 死亡数及び死亡率

死亡数は70,758人で、前年の69,537人より1,221人増加した。

死亡率は人口千人に対し9.9で、前年の9.7を0.2ポイント上回った。全国（11.1）と比較すると1.2ポイント下回っている。


死亡率の年次推移をみると、昭和35年7.9、昭和45年5.7、昭和55年4.5と低下し、以降4.5前後で推移していたが、昭和61年以降上昇傾向に転じた。（表－7、図－5）

表－7 死亡数及び死亡率の年次推移

		S35	40	45	50	55	60	H2	7
数	埼玉県	19 089	20 117	21 836	22 688	24 129	26 417	31 222	36 799
	全国	706 599	700 438	712 962	702 275	722 801	752 283	820 305	922 139
率	埼玉県	7.9	6.7	5.7	4.7	4.5	4.5	4.9	5.5
	全国	7.6	7.1	6.9	6.3	6.2	6.3	6.7	7.4
		12	17	22	27	29	30	R元	R2
数	埼玉県	40 486	48 095	55 487	62 566	65 770	67 726	69 537	70 758
	全国	961 653	1 083 796	1 197 014	1 290 510	1 340 567	1 362 470	1 381 093	1 372 755
率	埼玉県	5.9	6.9	7.8	8.7	9.2	9.4	9.7	9.9
	全国	7.7	8.6	9.5	10.3	10.8	11.0	11.2	11.1

注：率は人口千対である。

図－5 死亡率の年次推移（埼玉県・全国）



## イ 都道府県別にみた死亡率

都道府県別にみると、本県の死亡率は昭和 63 年以降平成 13 年まで低率順で第 1 位、平成 14、15 年は沖縄県に次いで第 2 位、平成 16 年以降は沖縄県及び神奈川県に次いで第 3 位、平成 27 年～29 年は第 4 位、平成 30 年は第 5 位、令和元、2 年は第 6 位となっている。

(表－8)

表－8 都道府県別にみた死亡率

	S60			H2			7			12			17		
	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位
高率順	全 国	6.3		全 国	6.7		全 国	7.4		全 国	7.7		全 国	8.6	
	高 知	8.7	1	高 知	9.3	1	島 根	10.0	1	高 知	10.2	1	島 根	11.6	1
	鹿 児 島	8.5	2	島 根	9.1	2	高 知	9.9	2	島 根	10.2	2	高 知	11.5	2
	島 根	8.3	3	鹿 児 島	8.8	3	鹿 児 島	9.6	3	秋 田	10.1	3	秋 田	11.4	3
	和 歌 山	8.2	4	徳 島	8.7	4	島 取	9.4	4	山 口	10.0	4	山 口	11.2	4
	徳 島	8.0	5	和 歌 山	8.7	5	山 口	9.4	5	鳥 取	9.7	5	山 形	11.0	5
	山 形	7.8	6	鳥 取	8.5	6	和 歌 山	9.4	6	徳 島	9.7	6	和 歌 山	10.9	6
	鳥 取	7.8	7	山 口	8.5	7	徳 島	9.2	7	和 歌 山	9.6	7	鹿 児 島	10.9	7
	大 分	7.8	8	山 形	8.3	8	秋 田	9.0	8	山 形	9.6	8	徳 島	10.7	8
	山 口	7.7	9	大 分	8.3	9	佐 賀	9.0	9	鹿 児 島	9.5	9	岩 手	10.6	9
佐 賀	7.6	10	佐 賀	8.3	10	愛 媛	9.0	10	大 分	9.3	10	愛 媛	10.6	10	
低率順	沖 縄	4.5	1	埼 玉	4.9	1	埼 玉	5.5	1	埼 玉	5.9	1	沖 縄	6.7	1
	埼 玉	4.5	2	神 奈 川	5.0	2	神 奈 川	5.7	2	神 奈 川	6.0	2	神 奈 川	6.8	2
	神 奈 川	4.6	3	千 葉	5.2	3	沖 縄	5.8	3	沖 縄	6.1	3	埼 玉	6.9	3
	千 葉	4.8	4	沖 縄	5.3	4	千 葉	6.0	4	千 葉	6.3	4	千 葉	7.4	4
	愛 知	5.1	5	愛 知	5.7	5	愛 知	6.3	5	愛 知	6.6	5	愛 知	7.4	5
	22			27			30			R元			2		
	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位	都道府県	率	順位
高率順	全 国	9.5		全 国	10.3		全 国	11.0		全 国	11.0		全 国	11.1	
	秋 田	13.2	1	秋 田	14.5	1	秋 田	15.8	1	秋 田	16.4	1	秋 田	16.1	1
	高 知	12.8	2	島 根	13.9	2	高 知	14.6	2	高 知	14.9	2	高 知	14.6	2
	島 根	12.8	3	高 知	13.8	3	島 根	14.5	3	青 森	14.9	3	青 森	14.5	3
	山 口	12.3	4	山 形	13.4	4	青 森	14.3	4	山 形	14.7	4	島 根	14.5	4
	山 形	12.1	5	青 森	13.1	5	山 形	14.1	5	岩 手	14.6	5	山 形	14.5	5
	和 歌 山	12.1	6	徳 島	13.1	6	岩 手	14.1	6	島 根	14.6	6	岩 手	14.3	6
	鹿 児 島	11.9	7	和 歌 山	13.1	7	和 歌 山	14.1	7	山 口	14.2	7	山 口	13.9	7
	徳 島	11.9	8	山 口	13.1	8	山 口	13.9	8	徳 島	14.0	8	徳 島	13.9	8
	岩 手	11.9	9	鹿 児 島	13.0	9	鹿 児 島	13.8	9	和 歌 山	14.0	9	和 歌 山	13.8	9
鳥 取	11.9	10	岩 手	12.9	10	徳 島	13.7	10	新 潟	13.9	10	愛 媛	13.6	10	
低率順	沖 縄	7.3	1	沖 縄	8.0	1	沖 縄	8.5	1	沖 縄	8.7	1	沖 縄	8.6	1
	神 奈 川	7.6	2	神 奈 川	8.4	2	東 京	8.9	2	東 京	9.0	2	東 京	9.0	2
	埼 玉	7.8	3	東 京	8.5	3	神 奈 川	9.2	3	神 奈 川	9.3	3	神 奈 川	9.4	3
	愛 知	8.1	4	埼 玉	8.7	4	愛 知	9.4	4	滋 賀	9.5	4	滋 賀	9.4	4
	東 京	8.1	5	愛 知	8.8	5	埼 玉	9.4	5	愛 知	9.6	5	愛 知	9.7	5
									埼 玉	9.7	6	埼 玉	9.9	6	

注 1：率は人口千対である。

注 2：順位の算出には、小数点第 2 位以下を考慮している。

## ウ 死因

### (ア) 死因順位

令和2年の死亡数を死因順位別にみると、第1位は悪性新生物 20,463人（死亡総数の28.9%）、第2位は心疾患 10,857人（15.3%）、第3位は老衰 5,842人（8.3%）、第4位は脳血管疾患 4,929人（7.0%）、第5位は肺炎 4,607人（6.5%）となっている。

死亡率（人口10万対）を前年と比較すると、老衰（81.6）が13.5ポイント、悪性新生物（285.8）が9.9ポイント、誤嚥性肺炎（25.0）が3.1ポイント、腎不全（19.5）が1.5ポイント、自殺（16.2）が1.2ポイント上昇した。

一方、肺炎（64.4）が14.7ポイント、心疾患（151.7）が3.3ポイント、不慮の事故（21.3）が1.0ポイント、脳血管疾患（68.8）、間質性肺疾患（15.0）が0.4ポイント低下した。

（表－9）

表－9 主な死因別死亡数及び死亡率（対前年比較）

埼玉県

死 因	令和2年			令和元年			令和元年との比較		
	数	率(人口 10万対)	死亡総数に 占める割合	数	率(人口 10万対)	死亡総数に 占める割合	数	率(人口 10万対)	死亡総数に 占める割合
総 数	70 758	988.4	100.0	69 537	969.3	100.0	1 221	19.1	
悪 性 新 生 物	20 463	285.8	28.9	19 791	275.9	28.5	672	9.9	0.4
心 疾 患	10 857	151.7	15.3	11 117	155.0	16.0	△ 260	△ 3.3	△ 0.7
老 衰	5 842	81.6	8.3	4 884	68.1	7.0	958	13.5	1.3
脳 血 管 疾 患	4 929	68.8	7.0	4 966	69.2	7.1	△ 37	△ 0.4	△ 0.1
肺 炎	4 607	64.4	6.5	5 677	79.1	8.2	△1 070	△ 14.7	△ 1.7
誤 嚥 性 肺 炎	1 790	25.0	2.5	1 571	21.9	2.3	219	3.1	0.2
不 慮 の 事 故	1 528	21.3	2.2	1 602	22.3	2.3	△ 74	△ 1.0	△ 0.1
腎 不 全	1 398	19.5	2.0	1 292	18.0	1.9	106	1.5	0.1
自 殺	1 159	16.2	1.6	1 078	15.0	1.6	81	1.2	-
間 質 性 肺 疾 患	1 074	15.0	1.5	1 102	15.4	1.6	△ 28	△ 0.4	△ 0.1
小 計	53 647	749.4	75.8	53 080	739.9	76.3	567	9.5	△ 0.5
そ の 他	17 111	239.0	24.2	16 457	229.4	23.7	654	9.6	0.5


死因別に死亡率（人口10万対）の年次推移をみると、悪性新生物は昭和55年以降概ね上昇が続き、平成15年には200.0を超え、令和2年は285.8となった。また、死因順位は、昭和56年以降第1位となり、令和2年の死亡総数に占める割合は28.9%となっている。

心疾患は、昭和60年に脳血管疾患にかわり第2位となり、その後も緩やかな上昇を続けており、平成14年から100.0を越えている。令和2年の死亡総数に占める割合は15.3%となっている。

脳血管疾患は昭和36年をピークに低下し、昭和56年には悪性新生物にかわり第2位に、さらに昭和60年には心疾患にかわり第3位となり、その後も低下傾向にある。平成23年には肺炎にかわり第4位となり、令和2年の死亡総数に占める割合は7.0%となっている。（表－9、図－6）

なお、平成6、7年の心疾患及び平成7年の脳血管疾患の著しい変動は、死亡傾向が急激に変化したものではなく、死因分類（ICD-10）及び死亡診断書の改正によるものと考えられる（図－6の「注」を参照）。

図－6 主要死因別死亡率の年次推移（埼玉県）



注：死因分類(ICD-10)及び死亡診断書の改正による影響


心疾患の平成6年から3年間は、大きく前年を下回っている。この低下は、平成7年1月施行の新しい死亡診断書（死体検案書）における注意書き「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」の影響が考えられる。

脳血管疾患は、平成7年は前年を大きく上回った。これは、死因分類の改正で、肺炎に影響を与えた疾患として脳出血を死亡原因とするようになった影響が考えられる。なお、逆に肺炎は減少している。

平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、平成29年1月適用の死因分類による原死因選択ルールの特異化によるものと考えられる。

年齢階級別に主要死因別割合をみると、30歳代以下では自殺、40～80歳代では悪性新生物、90歳以上では心疾患の割合が最も高くなっている。（図－7）

図－7 年齢階級別にみた主要死因別割合（埼玉県）



(イ) 悪性新生物（がん）

悪性新生物による死亡数は20,463人で、死亡総数の28.9%を占めており、全死亡者のおよそ10人に3人は悪性新生物で死亡したことになる。

年齢階級別にみると、70～79歳が7,172人で最も多く、次いで80～89歳が6,650人、60～69歳が3,006人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合をみると、60～69歳が45.9%で最も多く、次いで70～79歳が40.9%、50～59歳が38.8%となっている。（表－10）


死亡率は人口10万人に対し285.8で、前年より9.9ポイント上昇した。全国は前年より2.4ポイント上昇し306.6である。埼玉県及び全国の死亡率は上昇を続けている。

（図－8）

表－10 悪性新生物による死亡数及び割合（年齢階級別）


											埼玉県
	総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不詳
死亡総数	70 758	206	246	445	1 405	2 956	6 547	17 546	25 645	15 762	-
悪性新生物による死亡数	20 463	11	22	87	438	1 146	3 006	7 172	6 650	1 931	-
（各年齢階級別割合）	100.0%	0.1%	0.1%	0.4%	2.1%	5.6%	14.7%	35.0%	32.5%	9.4%	-
死亡総数に占める割合	28.9%	5.3%	8.9%	19.6%	31.2%	38.8%	45.9%	40.9%	25.9%	12.3%	-

図－8 悪性新生物による死亡率の年次推移（埼玉県・全国）



部位別にみると、「気管・気管支及び肺」が4,136人（20.2%）で最も多く、平成14年以降第1位となっている。また、平成28年に「大腸」が初めて「胃」を上回り第2位となった。令和2年は「大腸」が2,940人（14.4%）、「胃」が2,290人（11.2%）である。（図－9、表－11）

図－9 悪性新生物の部位別死亡割合の推移（埼玉県）



表－11 悪性新生物部位別死亡数及び割合の年次推移（埼玉県）

	S35	40	45	50	55	60	H2	7	12	17	22	27	30	R元	R2
総数	2 426	2 914	3 508	4 265	5 404	6 665	8 518	10 942	13 163	15 190	17 058	18 823	19 475	19 791	20 463
食道	120	142	183	192	207	264	321	420	500	614	635	662	670	691	648
胃	1 272	1 393	1 535	1 763	1 830	1 891	2 036	2 268	2 450	2 534	2 677	2 520	2 492	2 373	2 290
大腸	...	...	...	346	542	694	1 031	1 344	1 670	1 929	2 105	2 494	2 755	2 762	2 940
（結腸）	...	...	...	178	290	410	664	878	1 101	1 283	1 364	1 694	1 880	1 864	2 017
（直腸）	63	106	130	168	252	284	367	466	569	646	741	800	875	898	923
肝臓	229	222	249	266	383	604	912	1 088	1 344	1 443	1 457	1 294	1 192	1 267	1 181
すい臓	42	66	106	139	240	366	532	647	825	1 019	1 269	1 567	1 705	1 790	1 937
気管・気管支及び肺	95	174	281	407	652	958	1 292	1 846	2 215	2 829	3 163	3 788	3 821	3 949	4 136
乳房	40	38	77	110	158	199	253	362	511	607	726	806	804	838	850
子宮	138	159	139	160	170	166	176	228	236	261	305	331	396	388	403
白血病	58	84	98	158	169	200	230	287	276	302	376	435	396	403	475
その他	369	530	710	724	1 053	1 323	1 735	2 452	3 136	3 652	4 345	4 926	5 244	5 330	5 603
総数	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
食道	4.9	4.9	5.2	4.5	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	3.5	3.4	3.5	3.2
胃	52.4	47.8	43.8	41.3	33.9	28.4	23.9	20.7	18.6	16.7	15.7	13.4	12.8	12.0	11.2
大腸	...	...	...	8.1	10.0	10.4	12.1	12.3	12.7	12.7	12.3	13.2	14.1	14.0	14.4
（結腸）	...	...	...	4.2	5.4	6.2	7.8	8.0	8.4	8.4	8.0	9.0	9.7	9.4	9.9
（直腸）	2.6	3.6	3.7	3.9	4.7	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5
肝臓	9.4	7.6	7.1	6.2	7.1	9.1	10.7	9.9	10.2	9.5	8.5	6.9	6.1	6.4	5.8
すい臓	1.7	2.3	3.0	3.3	4.4	5.5	6.2	5.9	6.3	6.7	7.4	8.3	8.8	9.0	9.5
気管・気管支及び肺	3.9	6.0	8.0	9.5	12.1	14.4	15.2	16.9	16.8	18.6	18.5	20.1	19.6	20.0	20.2
乳房	1.6	1.3	2.2	2.6	2.9	3.0	3.0	3.3	3.9	4.0	4.3	4.3	4.1	4.2	4.2
子宮	5.7	5.5	4.0	3.8	3.1	2.5	2.1	2.1	1.8	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
白血病	2.4	2.9	2.8	3.7	3.1	3.0	2.7	2.6	2.1	2.0	2.2	2.3	2.0	2.0	2.3
その他	15.2	18.2	20.2	17.0	19.5	19.8	20.4	22.4	23.8	24.0	25.5	26.2	26.9	26.9	27.4

## (ウ) 心疾患

心疾患による死亡数は10,857人で、死亡総数の15.3%を占めている。

年齢階級別にみると、80～89歳が4,136人で最も多く、次いで90歳以上が2,822人、70～79歳が2,329人の順となっている。


また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、90歳以上が17.9%で最も多く、次いで80～89歳が16.1%、50～59歳が15.7%の順となっている。（表－12）

死亡率（人口10万対）は平成7年1月に死因分類及び死亡診断書の改正が行われた影響で、平成7年に一度大幅な低下を見せ、その後は上昇傾向にあったが令和2年に低下に転じた。令和2年は前年より3.3ポイント低下しし151.7であった。全国は前年より1.3ポイント低下し166.6である。（図－10）

表－12 心疾患による死亡数及び割合（年齢階級別）

	総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不詳
死亡総数	70 758	206	246	445	1 405	2 956	6 547	17 546	25 645	15 762	-
心疾患による死亡数	10 857	7	12	49	199	464	839	2 329	4 136	2 822	-
（各年齢階級別割合）	100.0%	0.1%	0.1%	0.5%	1.8%	4.3%	7.7%	21.5%	38.1%	26.0%	-
死亡総数に占める割合	15.3%	3.4%	4.9%	11.0%	14.2%	15.7%	12.8%	13.3%	16.1%	17.9%	-

図－10 心疾患による死亡率の年次推移（埼玉県・全国）





## (エ) 肺炎

肺炎による死亡数は4,607人で、死亡総数の6.5%を占めている。

年齢階級別にみると、80～89歳が2,090人で最も多く、次いで90歳以上が1,488人、70～79歳が806人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、90歳以上が9.4%で最も多く、次いで80～89歳が8.1%、70～79歳が4.6%の順となっている。（表-13）

死亡率（人口10万対）は総じて上昇傾向にあったが、平成29年1月適用の死因分類による原死因選択ルールの特化による影響から、平成29年に大幅に低下している。令和2年は前年より14.7ポイント低下し64.4となった。全国は前年より13.6ポイント低下し63.6となった。（図-11）

表-13 肺炎による死亡数及び割合（年齢階級別）

	総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不詳
死亡総数	70 758	206	246	445	1 405	2 956	6 547	17 546	25 645	15 762	-
肺炎による死亡数	4 607	-	-	6	20	42	155	806	2 090	1 488	-
（各年齢階級別割合）	100.0%	-	-	0.1%	0.4%	0.9%	3.4%	17.5%	45.4%	32.3%	-
死亡総数に占める割合	6.5%	-	-	1.3%	1.4%	1.4%	2.4%	4.6%	8.1%	9.4%	-

図-11 肺炎による死亡率の年次推移（埼玉県・全国）

死亡率（人口10万対）

